Radmilovacki muscat (par erreur)

Vass3R10s316-320

0Mtp943

FINA Collection Vassal-Montpellier

Radmilanacki museak 300 536 300

Radmilovacki museat 10 R9s-341-345







dontoolootoolootoolootool

ANNEE: 1993

NOM
Radmilovachi muscat

8 40 89

	540-09 mi														
ouche	Nbre yeux	Débourrement début mi/déb		Nbre grap	Ferti-	Floraison début mi/f fin			Véraison début mi/v fin			Maturité			
1	5	16,3	25. 3 A	2	2	27.5	30.5	2.6	19.7	27,7	3,8	23.8			
3	5	16.3	183	0											
4/0					Grappe: G - M - P Dim: 15 Compacité: L - M - C Pour: Mill:0 Baie: TG - G - M - P Dim: 19.16 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus										
5	1 0														
	_) le	18.3	9 3		Couleur: B-Gr-Rs-Rg-N Jus: inc - coloré Saveur: S- m - ar - fox - herb Pépins: avec - apyrène Port: ¿ vige Vigueur: 3										
		,													
						-			osie	9?					
							' '								

ANNEE: 1994

NOM Radmilovacké muscot EMPLACEMENT 10 R9 1 341.345

B	.40.8	9.	mi		3 R10 x \$16.320/								
ouche	ouche Nbre		Débourrement début mi/déb		Ferti- lité				Véraison début mi/v fin			Maturité	
1 2 %	4	3,3	7.3×	0									
3 % 4 % 5					Grappe: G - M - P Dim : Compacité: L - M - C Pour : Mill : Baie : TG - G - M - P Dim : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus								
	26	7.3.	34		Saveur Pépins Port:	: s -	m - aı	rène	ox - he	erb	- co	loré	
								<u></u>	igueur				

ANNEE: 1995

NOM Radmilovacki muscat EMPLACEMENT LO R9 1 341. 345

		(mi)		3 R10 & 316.320							
ouche	Nbre yeux	Débou début	rrement mi/deb	Mbre grap	Ferti- lité	Floraison début mi/f fin			Véraison début mi/v fin Matu			Maturit é
	22	13,3	16.3 ·	0								
3 1 3 5 3	J &	13.3.	25 (-4)		Couleur Saveur Pépins Port:	TG - disc-s r : B-C : s - : avec	Mil sph-el Gr-Rs- m - a	l: - P D: 1-ov-c Rg-N r - fc yrène	im: obov-cy Jus ox - he	yl-fus : inc	- cc	L-M-C

Radmilovacki museat 10 Rgs. 341-345.4.5 N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalées - en gouttière - autres.

Face inférieure : glabres 199 /- séteuses 200 - veloutées 201 aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 2/10 /entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures : glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233.)

A pétiole glabre 2(34) - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

Calvo 91

Radmilovacki museat 10 R 90. 341.345 s.5

N° d'ordre : Désignation : Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé.

Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 - séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289.

Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250.

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

Noeuds : dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256.

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

Vrille : verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263.

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

Bourgeon : coloré 264 - vert 265)

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit.

Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

-Calvo 92

Radmilovacki muscat 10 R90-341-345.013

Nº d'ordre : Désignation : Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 1/42/- grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273. limbe : glabre 150/- séteux 151 - velouté 152 -

aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface : unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161 de colais au quit jetiolaire

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

> Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 1/73 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277. partiellement - totalement.

Calvo 92

Radmilovacki muscat 10 R9s-341-345.s.1

N° d'ordre : Désignation : Emplacement :

Grosse 68- Moyenne 69- Petite 70 (dimensions $48 \times$). Lâche 71 - Moyenne 72 / Compacte 73. A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76. A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 + aoûté jusqu'à la première ramification 79. Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81.

BAIE Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière irrégulière (dimensions 18 x 16). De couleur blanc 87 gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91. Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94. Coloration régulare - irrégulière. Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104. A jus incolore 105 - coloré 106. A ombilic très apparent - peu apparent. A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109.

Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 1(1.) A saveur neutre 1/2) - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale 118.

De séparation facile (égreneuse) - difficile. A pédicelle long 119 - moyen 120 / court 121.

A pédicelle de couleur : verte 122 / rouge 123 - irrégulière 124.

A bourrelet de couleur verte 125) - rouge 126 - irrégulière 127.

A bourrelet évident 128 - peu apparent 129)

A pinceau : court 130 - moyen 131 - long 132.

A pinceau : coloré 133 - non coloré 134,

A peau fine 135 - moyenne 186 - épaisse 137.

A pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse. Avec pépins - apyrène.

Calvo 93

Radmilovacki muscat

DENOMINATION : EMPLACEMENT : 10 R90-341-3454.1

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramifié (1) - peu ramifié (2). Sarment

: adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce

détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4).

Surface

unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).

pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).

glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils

massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7)
duveteux (8) -cotonneux (9).

: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

: aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). Noeuds

Mérithalle de longueur moyenne : cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). Yeux : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2) : saillant (1) - effacé (2).

: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

od'ordre: Radmilovacki muscat implacement: No R9 A341.345

```
: (1)-(2)-3
ingle des nervures
                                  : 4 - 5 - 6
                                  : (7)-8-9
1/I.
                                  : 10 - (11) .
.2/L
                                  : 12 - 13 - (14) - 15 - 16
Nombre de lobes
                                  : 17 - 18 - (19) - (20)
Prof. sinus latéral Sup.
                                 : 21 - (22) - (23) - 24
Prof. sinus latéral Inf.
                              : 25 - (26 - (27) - 28 - 29
Forme sinus pétiolaire
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
                                   : (267)
Sinus pétiolaire ouvert
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
                                  : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - (38) (39)
Forme sinus latéral Sup.
Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : 269 - autre : (270)
                                   : 271
Sinus latéral Supérieur ouvert
                                   : 40 - (41)
Dents : forme
                                   : (42) - 43 - 44
Dents (angle)
                                   : 45 - 46 - (47)
Angle du lobe terminal
Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - 49 - 50
                                  : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59
Nbre dents du point pét. à L3
                                   : (60) - 61 - 62
Angle des nervures L3 L'3
                                   : 63 - (64) - (65) - 66 - 67
Largeur du sinus pétiolaire
```

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - oqivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües